

**Corrigé du brevet des collèges Pondichéry**  
**2 mai 2017**

**EXERCICE 1**

**5 POINTS**

1.  $E = x \times 2x + x \times 3 - 2 \times 2x - 2 \times 3 - 3x + 6$   
 $E = 2x^2 + 3x - 4x - 6 - 3x + 6$   
 $E = 2x^2 - 4x.$
2.  $(x - 2)$  est un facteur commun de la différence, donc  
 $E = (x - 2)[(2x + 3) - 3]$   
 $E = (x - 2)[2x + 3 - 3]$   
 $E = (x - 2) \times 2x = 2x(x - 2) = 2F.$
3.  $(x - 2)(2x + 3) - 3(x - 2) = 0$  si et seulement si  $2x(x - 2) = 0$  soit  
$$\begin{cases} 2x = 0 & \text{ou} \\ x - 2 = 0 & \end{cases} \text{ soit } \begin{cases} x = 0 & \text{ou} \\ x = 2 & \end{cases}$$
Les solutions sont 0 et 2.

**EXERCICE 2**

**6 POINTS**

1. On a  $p(13) = \frac{1}{20}.$
2. Sur 20 boules, 10 portent un numéro pair, donc  $p(\text{pair}) = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}.$
3. Entre 1 et 20 ces deux nombres compris, les multiples de 4 sont : 4, 8, 12, 16 et 20 : il y a en a donc 5.  
 $p(\text{multiple de 4}) = \frac{5}{20} = \frac{5 \times 1}{5 \times 4} = \frac{1}{4}.$   
Les diviseurs de 4 sont : 1, 2, et 4. Donc  
 $p(\text{diviseur de 4}) = \frac{3}{20}.$   
Comme  $\frac{3}{20} < \frac{5}{20}$ , la probabilité d'obtenir un multiple de 4 est plus grande que celle d'obtenir un diviseur de 4.
4. Les naturels premiers entre 1 et 20, sont :  
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, soit 8 naturels. Donc  
 $p(\text{premier}) = \frac{8}{20} = \frac{4 \times 2}{4 \times 5} = \frac{2}{5}.$

**EXERCICE 3**

**7 POINTS**

1. **a.**  $x = 5$   
étape 1 =  $6 \times 5 = 30$   
étape 2 =  $30 + 10 = 40$   
résultat =  $40 : 2 = 20$   
dire « J'obtiens finalement 20 ».
- b.**  $x = 7$   
étape 1 =  $6 \times 7 = 42$   
étape 2 =  $42 + 10 = 52$   
résultat =  $52 : 2 = 26$   
dire « J'obtiens finalement 26 ».
2. Pour retrouver le nombre du départ il faut « remonter » l'algorithme, d'où  
résultat = 8 entraîne que étape 2 =  $8 \times 2 = 16$   
étape 1 =  $16 - 10 = 6$   
 $x = 1$   
Julie a choisi le nombre 1.

3. étape 1 =  $6 \times x = 6x$   
 étape 2 =  $6x + 10$   
 résultat =  $(6x + 10) : 2 = \frac{6x + 10}{2} = \frac{2(3x + 5)}{2} = 3x + 5$ , ou encore  
 $= (6x + 10) : 2 = 6x : 2 + 10 : 2 = 3x + 5$ .
4. Soit  $x$  le nombre choisi.  
 Le programme de Maxime donne :  $(x + 2) \times 5 = 5(x + 2) = 5x + 10$ .  
 On veut que  $5x + 10 = 3x + 5$ , d'où  
 $5x - 3x + 10 = 3x - 3x + 5$   
 $2x + 10 = 5$ , puis  
 $2x + 10 - 10 = 5 - 10$   
 $2x = -5$ , d'où  $\frac{1}{2} \times 2x = -5 \times \frac{1}{2}$  et enfin  
 $x = \frac{-5}{2} = \frac{-25}{10} = -2,5$ .  
 Si on choisit  $\frac{-5}{2} = -2,5$ , les deux programmes donnent le même résultat.

## EXERCICE 4

7 POINTS

1.  $\frac{18}{15} = \frac{x}{60}$ . Sa fréquence cardiaque est donc  $\frac{18 \times 60}{15} = 72$  pulsations par minute.  
 Ou en supposant les pulsations régulières sur 60 secondes :  
 18 en 15 (s) donnent 36 en 30 (s) et 72 en 60 (s).
2. Il y a  $\frac{60}{0,8} = \frac{600}{8} = \frac{8 \times 75}{8 \times 1} = 75$  intervalles donc 76 pulsations/min.
3. a. L'étendue est la différence entre la plus haute et la plus basse fréquence :  
 $E = 182 - 65 = 117$  pulsations /min.
- b. On divise le nombre total de pulsation par la fréquence moyenne, d'où  
 $\frac{3640}{130} = 28$  minutes.  
 L'entraînement a duré environ 28 minutes.
4. a. Denis a 32 ans, donc sa FCMC est  $f(32) = 220 - 32 = 188$  pulsations/minute.
- b. Pour une personne de 15 ans, la FCMC est  $f(15) = 220 - 15 = 205$  pulsations/minute.  
 La FCMC de Denis est inférieure à la FCMC d'une personne de 15 ans.
5.  $= 191,5 - 0,007 * A2 * A2$ .

## EXERCICE 5

8 POINTS

1. a. La production totale d'électricité en France en 2014 est égale à :  
 $25,8 + 67,5 + 31 + 415,9 = 540,2$  TWh
- b. La proportion d'électricité produite par les « Autres énergies (dont la géothermie) » est :  
 $\frac{31}{540,2} \approx 0,0574$  soit environ  $0,057 = 5,7\%$ .
2. Tom considère les pourcentages : ce sont les autres énergies qui ont le plus augmenté leur production par rapport à la production de 2013.  
 Alice a calculé les variations de production en TWh : avec une augmentation de 12,1 TWh, c'est la nucléaire qui a le plus augmenté sa production (en quantité), alors que les autres énergies ont augmenté de  $31 - 28,1 = 2,9$  TWh.
3. a.  $R = 23$  cm =  $0,23$  m ;  $r = 10$  cm =  $0,1$  m  
 $V = \frac{\pi}{3} \times 2500 \times (0,23^2 + 0,23 \times 0,1 + 0,1^2) \approx 225$  m<sup>3</sup>.
- b. Augmenter de 30 % c'est multiplier par  $1 + \frac{30}{100}$ , d'où  
 $V_{\text{terre extraite}} = 225 \left(1 + \frac{30}{100}\right) = 225 \times 1,30 = 292,5$  m<sup>3</sup>.

**EXERCICE 6****7 POINTS**

- Route descendant du château des Adhémar, à Montélimar. La pente est égale à 24 %.
- Tronçon d'une route descendant du col du Grand Colombier (Ain) : Le triangle est rectangle.

On appelle  $d$  le déplacement horizontal.

D'après l'égalité de Pythagore, on a :  $d^2 = 1500^2 - 280^2 = 2171600$ .

$d = \sqrt{2171600} \approx 1474$  m.

Donc la pente est égale à  $\frac{280}{1474} \approx 18,9\%$ .

- Tronçon d'une route descendant de l'Alto de l'Angliru (région des Asturies, Espagne) : le triangle est rectangle,

donc  $\tan 12,4 = \frac{\text{dénivelé}}{146}$ , d'où dénivelé =  $146 \times \tan 12,4 \approx 32,10$  (m).

La pente est égale à  $\frac{32,10}{146} \approx 21,98\%$  soit environ 22 %.

- On pouvait aussi simplement dire que  $\tan 12,4 = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}} =$

$\frac{\text{dénivelé}}{\text{déplacement horizontal}} \approx 0,22 = 22\%$ .

- Classement :

1. Route descendant du château des Adhémar, à Montélimar
2. Tronçon d'une route descendant de l'Alto de l'Angliru (région des Asturies, Espagne)
3. Tronçon d'une route descendant du col du Grand Colombier (Ain)

**EXERCICE 7****5 POINTS**

1. Si le tarif était proportionnel à la masse, la lettre de  $100 = 5 \times 20$  (g) devrait être affranchie  $5 \times 0,80 = 4$  €. Non, le tarif n'est pas proportionnel à la masse.
2. Il lui faut 1 enveloppe et 4 pages.

- Une enveloppe a un poids de  $\frac{175}{50} = \frac{350}{100} = 3,5$  g.

- Une feuille a une aire de :

$0,21 \times 0,297 = 0,06237$  m<sup>2</sup> et donc un poids de :

$0,06237 \times 80 = 4,9896$ .

4 feuilles ont donc un poids de  $4 \times 4,9896 = 19,9584$

Masse totale d'un courrier (sans compter sur le poids du timbre!) :

$3,5 + 19,9584 = 23,4584$  g. Il dépasse 20 g.

Il doit donc payer 1,60 €.